

	國立成功大學附設醫院 核子醫學科	39 號衛教單
檢查名稱	小兒 chloral hydrate 麻醉注意事項	
檢查地點	住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科 (請詳核醫地點圖示)	聯絡電話 (06)2353535-2470、2471
主要目的	協助病童入睡，順利完成檢查。	
檢查流程	口服或經肛門直腸灌入鎮靜藥物	
注意事項	<p>一、鎮靜藥物使用目的</p> <p>核子醫學攝影需要病患檢查過程中靜止不動，為了順利完成檢查，會給予口服或經肛門直腸灌入鎮靜藥物，協助病童入睡。</p> <p>二、鎮靜藥物</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chloral hydrate (CH) 為非疼痛/侵入性檢查常見的鎮靜藥物，其給藥途徑有口服及肛門直腸灌腸給予。 2. 因味道苦澀，口服時容易引發噁心及嘔吐感。 3. 鎮靜效果與副作用的影響和給藥前是否禁食、劑量、年紀及病童的健康狀態有關。 4. 使用藥物後約 10-15 分鐘開始作用，30 分鐘會熟睡，大部分幼童 1-2 小時會逐漸清醒，少數鎮靜效果有可能會持續到 24 小時。 <p>三、鎮靜藥物的風險與副作用</p> <p>CH 是一種有效且少副作用的鎮靜劑，偶而會出現噁心嘔吐、血氧下降、似是而非的興奮吵鬧、哭、困惑、鎮靜時間過長、行動不穩、無力、頭痛、昏睡、或深度鎮靜的效果。但是鮮少有心血管與呼吸道副作用的影響。</p> <p>四、鎮靜前注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於鎮靜前避免讓兒童入睡。 2. 請告知醫護人員最後一次進食的時間，不需刻意禁食。 3. 請告知醫護人員幼兒的身高、體重、藥物過敏史、目前用藥、內外科病史、以及麻醉相關病史。 <p>五、鎮靜期間注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒熟睡期間至檢查完成前禁止餵食。 2. 過程中，醫護人員會密切評估觀察(呼吸頻率、意識狀態、活動力)。 3. 門診與轉診代檢受檢者鎮靜後應在本科內觀察至幼兒清醒。 <p>六、返家後注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒完全清醒後，可先飲用白開水，無嗆咳現象，才能正常飲食。 2. 幼兒的協調能力可能會暫時性受影響，少部分幼兒會有暫時性煩躁、哭鬧不安，請家長在旁陪同，避免發生危險。 3. 若發現幼兒有紅疹、噁心、嘔吐、眩暈等症狀，可能是藥物過敏所致，請帶至醫院就診或急診處理。 4. 對以上事項有疑問處，請諮詢核醫護理人員、醫師。 	
發行日期	111.08.05	