

	<p style="text-align: center;">國立成功大學附設醫院 核子醫學科</p>		<p style="text-align: center;">6號衛教單</p>
<p style="text-align: center;">檢 查 名 稱</p>	<p>唾液腺閃爍攝影 Salivary Scintigraphy</p>		
<p style="text-align: center;">檢 查 地 點</p>	<p style="text-align: center;">住院大樓一樓核子醫學科</p>	<p style="text-align: center;">聯絡 電 話</p>	<p style="text-align: center;">(06)2353535-2470、2471</p>
<p style="text-align: center;">主 要 目 的</p>	<p>一、唾液腺功能評估，特別是口乾症狀(Sjorgren's 症候群)之評估，例如慢性唾液腺炎或接受頭頸部放射治療後的唾液腺評估。 二、某些唾液腺腫瘤之鑑別診斷。 三、唾液腺結石評估。</p>		
<p style="text-align: center;">檢 查 流 程</p>	<p>一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫且核對您的名字，並通知您解小便後再至注射室外等候 二、至注射室，醫護人員會從靜脈注射藥物：Tc-99m pertechnetate。 三、注射藥物後立即至核醫造影室進行造影，依放射師指示平躺於檢查床上，本檢查需靜躺檢查床上造影至少約 70 分鐘以上，檢查中並不會有任何不適。</p>		
<p style="text-align: center;">注 意 事 項</p>	<p>一、本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、為避免對影像結果造成誤判，您頭部位置如有金屬製品例如髮夾、助聽器、項鍊等，造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、注入體內之放射性同位素會由人體自行代謝，極少會發生過敏反應。 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性短且非常昂貴），為避免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。 六、本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>		
<p>發行日期： <u>111.08.05</u></p>			