


| | | | |
|---|--|----------|-----------------------|
|  | 國立成功大學附設醫院 核子醫學科 | | 7 號衛教單 |
| 檢查 名稱 | 胃食道逆流檢查 Enterogastrosoph-ageal Reflux | | |
| 檢查 地點 | 住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科 (請詳核醫地點圖示) | 聯絡 電話 | (06)2353535-2470、2471 |
| 主要目的 | 一、評估胃-食道逆流的情形及嚴重度。 二、評估是否有逆流物吸入肺臟的情形。 | | |
| 檢查流程 | 一、本檢查當日必須禁食早餐，空腹至少 4 小時以上。 二、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有放射師會呼叫、核對您的名字通知您解小便後再至核醫造影室。 三、將放射性藥物(Tc-99m DTPA)加到 300c. c. 的柳橙汁或其他酸性飲料中，請您盡快喝完。 四、喝完藥物後立即進行造影，本檢查需靜躺檢查床上造影約 60 分鐘，檢查中並不會有任何不適。 | | |
| 注意事項 | 一、本檢查需禁食 4 小時以上。 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。 六、本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。。 | | |
| 發行日期:109.04.17 | | | |