

	<p style="text-align: center;">國立成功大學附設醫院 核子醫學科</p>		<p style="text-align: right;">38 號衛教單</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>鐳 223 放射性同位素治療</p>		
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)地下一樓正子中心 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電 話</p>	<p>(06)2353535-4683、4684</p>
<p>主要目的</p>	<p>用於癌症病患治療有症狀的骨轉移。</p>		
<p>檢查流程</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請持抽血檢查單於治療前按照臨床醫師要求日期時間至門診抽血。 2. 治療前，由護理師放置靜脈留置針，進行醫師問診及說明。 3. 完成靜脈注射鐳 223 藥物後即可離開醫院。 		
<p>注意事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請持抽血檢查單於治療前按照臨床醫師要求日期時間至門診抽血。 2. 鐳223藥品價格昂貴且有時效性，請準時報到，以利於指定注射時間使用。倘若該日不克至本中心受檢，請務必於受檢前一週的星期二下午五時前通知本中心。連絡電話：(06)2353535分機4683 3. 治療前不需禁食(若無其他檢查或治療需要禁食)。 4. 治療前四天起要停止服用鈣片與維生素D至治療後四天，其他藥物則可維持使用。 5. 接受治療後不需要隔離，可照常進行一般社交活動，而不須憂慮對周遭的人造成放射線危害。飲食也可如常(若無其他檢查或治療需要禁食)。 6. 在接受治療後的一星期內，請請採坐姿解尿，每次上完廁所後，使用過的衛生紙丟入馬桶內隨排泄物一併沖走，請放下馬桶蓋沖水兩次，並且徹底清潔手部。 7. 在接受治療後的一星期內，若有體液、排泄物需要清理，請以衛生紙擦拭後投入馬桶內沖走。若是衣物、床單遭沾染，請隨即單獨清洗。 8. 治療期間以及治療後6個月內必須使用有效的避孕方式。 9. 若對疾病有不瞭解，請與開檢查單的醫師討論。 10. 治療之風險：(沒有任何檢查/處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。) <ol style="list-style-type: none"> 10.1 非常常見不良反應(大於或等於每十位患者出現一例)：血小板減少症、胃腸道疾患(腹瀉、嘔吐、噁心)。 10.2 常見不良反應(介於每十位至每百位患者出現一例)：嗜中性白血球減少症、全血球減少症、白血球減少症、注射部位反應(例如紅斑、疼痛及腫脹)。 10.3 不常見不良反應(介於每百位至每千位患者出現一例)：淋巴球減少症。 <p>對以上事項有疑問處，請諮詢核醫護理人員、醫師。</p>		
<p>發行日期： 111.05.30</p>			