



國立成功大學附設醫院
核子醫學科

23號衛教單

檢 查
名 稱

陰囊攝影
Scrotal Scan

檢 查
地 點

住院大樓一樓核子醫學科

聯 絡
電 話

(06)2353535-2470、2471

主要目的

- 一、區分睪丸扭轉和急性副睪炎。
- 二、偵測造成男性不孕症之精索靜脈曲張(varicocele)。

檢查流程

- 一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。
- 二、先至注射室，醫護人員會在您身上放置靜脈注射留置針。並由靜脈留置針頭注射藥物：cold-PYP。
- 三、請在等候區等候約 15-30 分鐘左右，放射師會出來叫號並核對您的名字後引導至攝影室造影，造影時護理人員由留置針頭注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate，並同時進行造影，造影時需以站立方式檢查，如為無法配合站立之嬰幼兒則平躺於床上造影，時間約 20-30 分鐘，檢查中並不會有任何不適。完成檢查後，醫護人員會幫您拔除靜脈留置針。
- 四、若是無法配合檢查之嬰幼兒，則需給予鎮靜劑入睡後才能執行上述之檢查，檢查完成後待嬰幼兒醒來經醫師評估才可離開，回家應持續觀察嬰幼兒睡眠呼吸有無異狀，如有異狀應立即回院觀察。

注意事項

- 一、本檢查不需禁食，生活作息如常
- 二、本檢查以站姿造影，如嬰幼兒無法配合者，才以平躺檢查床上方式造影。
- 三、為避免對影像結果造成誤判，身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。
- 四、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能之陪伴者，請務必事前告知排程人員，以維護本身之安全。
- 五、嬰幼兒如因配合檢查需要鎮靜者，請於檢查前勿讓小朋友睡覺，檢查前會施予鎮靜灌睡。
- 六、注入體內之放射性同位素為人體自行代謝，極少會發生過敏反應。
- 七、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不

	<p>克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。 八、本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>
--	---

<p>發行日期：<u>112.03.31</u></p>
